

پلاویکس - اسویکس (کلوپید و گرل) چیست؟

یکی از دارو های ضد تجمع پلاکتی است که ثابت شده خطر بروز مجدد سکنه مغزی و یا حمله قلبی را کاهش می دهد.



پلاکت چیست؟

• پلاکت از سلول های درون خون است که در جلوگیری از خونریزی به خصوص در مراحل اولیه نقش اساسی دارد و در سکنه های قلبی یا مغزی یا استفاده از استنت باید با مصرف دارو کارائی آن ها را کاهش داد.

معنی داروی ضد پلاکتی چیست؟

دارو های ضد پلاکتی مانند پلاویکس یا اسویکس (نوع ایرانی) برای جلوگیری از تشکیل لخته در عروق مصرف می شوند تا خون به راحتی در عروق جریان یافته و اکسیژن به ارگان های حیاتی بدن مانند مغز و قلب برسد.

موارد مصرف این دارو چیست؟

این دارو جهت پیشگیری از لخته بعد از سکنه قلبی، سکنه مغزی همچنین پس از اعمال استنت گذاری عروق

قلب، توسط پزشکان تجویز می شود.

راه مصرف این دارو چگونه است؟

(پلاویکس - اسویکس) به صورت قرص های ۷۵ میلی گرم وجود دارد که به طور خوراکی مصرف می شود. معمولاً یک بار در روز همراه با غذا یا به تنهایی و در زمان مشخص داده می شود مقدار و زمان مصرف این قرص طبق تجویز پزشک معالج فرد تعیین می شود. مشورت با پزشک معالج با توجه به اهمیت این قرص بسیار ضروری است. نیمه عمر این دارو ۸ ساعت است و از طریق کلیه ها و روده دفع می شود.

عوارض جانبی این دارو چیست؟

مصرف (پلاویکس - اسویکس) می تواند باعث ایجاد راش پوستی، خارش، اسهال، التهاب معده، خونریزی از بینی، سرگیجه، ضعف، سر درد شود ولی مهم ترین عارضه جانبی خونریزی است که البته بسیار نادر است.



چه مواردی باید هنگام مصرف این دارو رعایت شود؟

• از آنجا که این دارو مانع ایجاد لخته خونی می شود می تواند باعث تشدید خونریزی گردد، بنابراین باید حتی المقدور خود را از وقوع هر گونه ضربه محافظت نمایید.

• بیمارانی که این دارو را مصرف می کنند باید از نوشیدن الکل جدا خودداری نمایند زیرا الکل می تواند میزان خونریزی از معده و روده را افزایش دهد.

• قبل از انجام هر گونه اقدامات جراحی یا دندانپزشکی موضوع مصرف این قرص را حتماً به اطلاع پزشک مربوطه برسانید، زیرا در مواردی لازم است که شما حداقل ۵ روز قبل از انجام اعمال مذکور از مصرف (پلاویکس - اسویکس) خودداری نمایید تا مانع از خطر افزایش خونریزی غیر قابل کنترل گردد.

• هرگز در زمانی که تحت درمان با این دارو هستید بدون مشورت پزشکتان از دارو های مسکن ضد التهاب غیر استروئیدی (مانند ایبوپروفن، دیکلوفناک، مفنمیک اسید) و همچنین فنی توئین و ... استفاده نکنید.



• در بیمارانی که به (پلاویکس - اسویکس) آلرژی و حساسیت دارند یا مبتلا به خونریزی فعال مانند خونریزی از زخم معده یا خونریزی مغزی هستند، این دارو می تواند بسیار خطرناک باشد لذا جهت مصرف آن باید با پزشک خود فوراً مشورت نمایند.

• هر گونه حساسیت دارویی را قبل از مصرف دارو، به اطلاع پزشک برسانید



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی لرستان
بیمارستان آیت الله بروجردی

ویژه بیماران

ارزش قیصر عربی خدایا

کلوپیدوگرل (پلاویکس - اسویکس)



تهیه و تنظیم:

واحد آموزش سلامت

قرار می گیرند مصروف روزانه این دارو از ۷ روز قبل از عمل شروع می شود و ادامه آن بعد از عمل با توجه به نظر پزشک ممکن است تا چند سال ادامه یابد لذا از قطع خودسرانه این دارو جدا اجتناب کنید. زیرا عدم مصرف این دارو می توانند با تولید لخته در عروق قلب سبب مرگ ناگهانی شود.

در موارد زیر فوراً به پزشک خود مراجعه کنید:

- هر گاه با خونریزی در یکی از اعضاء خود مانند معده و روده روبرو شدید
- مشاهده مدفوع خونی یا سیاه رنگ
- استفراغ خونی یا سرفه هایی به همراه دفع خون

نکته:

مصرف (پلاویکس - اسویکس) در مادران باردار و شیر ده با احتیاط و با نظر پزشک مربوطه می باشد.

همچنین موارد زیر را نیز به اطلاع پزشک

برسانید:

- ۱- ابتلا به بیماری کلیوی
- ۲- وجود هر گونه اختلال انعقادی خونی مانند بیماری هموفیلی و اختلالات پلاکتی.
- ۳- سابقه مصرف وارفارین
- ۴- سابقه سکته مغزی TIA (سکته خفیف مغزی)
- ۵- ابتلا به زخم معده یا بیماری کولیت السراتیو
- ۶- ابتلا به بیماری کبد

- جهت کاهش عوارض گوارشی، دارو را بعد از غذا میل کنید. بیمارانی که از ازدیاد ترشح اسید معده رنج می برند می توانند با نظر پزشک معالج از دارو هایی مثل فاموتیدین یا سایمتدین استفاده نمایند. در صورت نیاز به مصرف امپرازول، پنتوپرازول ... نیز با پزشک معالج خود مشورت نمایید.



نکته مهم:

برای بیمارانی که تحت عمل بالن (آنژیوپلاستی)