

مقدمه:

تعریف عفونت: عفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماری زای عفونی دچار آسیب می شود.

عفونت بیمارستانی

عفونتی که به صورت محدود و یا منتشر و در اثر واکنش های بیماریزای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن در بیمارستان ایجاد می شود به شرطی که شرایط ذیل مهیا باشد:

الف) حداقل ۴۸ تا ۷۲ ساعت از زمان پذیرش بیمار در بیمارستان گذشته باشد.

ب) در زمان پذیرش، فرد علائم آشکار عفونت مثل تب، سوزش ادرار، ترشح چرکی و... نداشته باشد و بیماری در دوران نهفتگی نباشد.

در صورت بروز علائم ذیل دوهفته بعد از ترخیص از بیمارستان به عفونت بیمارستانی مشکوک شده و به پزشک متخصص عفونی مراجعه نمایند.

تب بالای ۳۸ درجه



لرز



ترشح چرکی از زخم جراحی



سوزش ادرار و تکرر ادرار به همراه تب در صورت داشتن سوند ادراری در زمان بستری در بیمارستان یا پس از ترخیص در منزل



اهمیت شستن و دستها در بیمارستان در کنترل عفونت های بیمارستانی بسیار حائز اهمیت است. با شستن دست ها به طریق صحیح خطر انتقال عفونت ها به حداقل می رسد






دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

بیمارستان آیت ا... بروجردی

هشدار علائم

عفونت های بیمارستانی

ویژه بیماران و همراهان



واحد آموزش سلامت

توجه و هشدار

در صورت بروز تب، سرفه، سوزش ادرار یا ترشح چرکی از زخم جراحی، در طی دو هفته بعد از ترخیص با شماره تلفن:

۰۶۶۴۲۳۴۷۶۰۳ داخلی ۱۲۰۸-۱۱۱۶

منبع و مأخذ: راهنمای کشوری کنترل عفونت های بیمارستانی

استفاده از دستکش در حین مراقبت از بیمار هیچ وقت نبایستی جایگزین شستن دستها شود.

مدت زمان استاندارد شستشوی دست با آب و صابون مایع ۴۰-۶۰ ثانیه می باشد و جهت ضد عفونی دستها با ماده ای الکلی با پایه الکلی ۳۰-۲۰ ثانیه می باشد.



